


Pero - *Pyrus communis*

Albero vigoroso, di forma piramidale nei primi anni e tendenzialmente globoso a maturità, che può raggiungere un'altezza anche di 15-18 metri. E' preferibile, nell'ambito dello stesso impianto, accostare tra loro soggetti di diverse varietà per facilitare l'impollinazione. Il fusto è grigiastro e rugoso, le foglie sono lisce, di forma ovale, con pagina superiore di colore verde brillante, più chiara quella inferiore. I fiori sono bianchi, con corolla formata da 5 petali; la fioritura inizia tra la fine di marzo e la metà di aprile. Il frutto può presentare diverse forme (da tondeggianti ad allungato); i colori possono variare dal verde al giallo al rosso al ruggine; la maturazione parte da metà giugno per le varietà più precoci, protrahendosi fino a ottobre per le varietà più tardive.



Gli artropodi che colpiscono le piante di pero sono: la carpocapsa (*Carpocapsa pomonella*), l'afide (*Dysaphis pyri*), la cocciniglia (*Quadraspidiotus perniciosus*), le psille (*Psilla pyri*, *P. pyricola*, *P. pyrisuga*), i rodilegno (*Coccus coccus*, *Zeuzera pyrina*), la tingide (*Stephanitis pyri*), i ricamatori (*Pandemis cerasana*, *Archips podanus*, *Argyrotaenia pulchellana*), la cecidomia (*Dasyneura pyri*, *Contarinia pyrivora*) e gli acari (*Phytoptus pyri*, *Epitrimerus pyri*).



Gli artropodi predatori utili sono: le coccinelle (*Adalia bipunctata*, *Stethorus punctillum*), gli insetti pirata (*Orius insidiosus* e *Orius niger*, *Anthocoris nemorum*), l'imenottero (*Prionomitus mitratus*), i miridi (*Stethoconus cyrtopeltis*, *Malcoris chlorizans*), gli acari o ragnetti (*Allothrombium fuliginosum* e *Zetzellia mali*, *Phytoseiulus persimilis*).

